Sur quelques Reptiles et Batraciens du Nord du Soudan français,

par M. F. Angel.

Le Service d'herpétologie a reçu dernièrement, par l'intermédiaire de M. le Professeur Chevalier, une petite collection de Reptiles recueillis par MM. Rogeon et Leclercq, au Soudan, dans les localités de Bamdiagara, Diré, Goundam. Les renseignements accompagnant l'envoi donnent : les noms vernaculaires des principales espèces, l'opinion des indigènes sur le danger qu'elles présentent pour l'homme, et la coloration, en vie, de certains animaux.

Un serpent de cette collection, *Zamenis diadema*, mérite une mention spéciale, en raison de son habitat.

LACERTILIENS

Tarentola senegalensis Boulgr. — 2 ex.; Goundam; trouvés dans les pierres et les rochers.

Agama colonorum Daudin. — 4 ex. : ♂, ♀ et jeunes; Goundam; très nombreux sur les murs des cases et dans la brousse. — Coloration en vie : ♂ tête jaune, corps bleu métallique, queue jaune et bleue. ♀ grise avec des taches jaunes et bleues.

Noms vernaculaires : ♂, en Bambara : *Diéké;* ♀ : *Bassamsso;* en Sonraye : *M'Baga.*

Varanus exanthematicus Bosc. — 1 ex. jeune de Goundam; au bord d'un marigot. Signalé comme très rare, dans cet endroit, par le voyageur.

Latastia longicaudata Reuss, *forma typica* Boulgr. 2 ex. de Goundam, capturés sur la dune.

Nom Sonraye : *Méla.*

Écailles gulaires : 41; pores fémoraux : 10; lamelles sous le quatrième orteil : 27.

Cette jolie forme, à coloration variable, montre une vaste répartition géographique s'étendant de la Péninsule du Sinaï à l'Abyssinie, et de celle-ci au Tchad et au Sénégal.

Acanthodactylus scutellatus Dumerili M. Edwards; 2 ex. de Goundam et 2 autres de M'Bouna (rive sud du Lac Faguibine). — Très nombreux dans les dunes au bord de l'eau (21 juin 1932).

Cette variété, bien connue des contrées Trarza en Mauritanie, Dakar, Saint-Louis, Cap Vert, ne nous paraît pas avoir jamais été

signalée d'un point de l'intérieur aussi éloigné que l'endroit de capture des échantillons présents.

Mabuia quinquetæniata Licht. 1 ex. Goundam; dans la brousse. — 34 rangs d'écailles autour du milieu du corps.

Forme largement répandue sur l'Afrique tropicale et du Nord-Est, ainsi qu'en Arabie.

OPHIDIENS

Eryx Muelleri Boulenger. — 1 ex. de Bandiagara, signalé, à tort, comme très venimeux.

Philothamnus semivariegatus Smith. — 1 ex. de Bandiagara. — Nom Habbé : *Alakara guindé;* signalé peu venimeux. — Espèce inoffensive.

Zamenis diadema Schlegel. — 1 ex. Goundam, dans la brousse. Nom Sonraye : *Koudi*. Considéré, à tort, comme venimeux.

Cette espèce, bien connue de l'Algérie et la Tunisie sahariennes, du Maroc, Tripoli, Nubie, Arabie, Syrie, Mésopotamie, Perse, n'a jamais été, à notre connaissance, signalée du Soudan.

Psammophis elegans Shaw. — 1 ex. de Bandiagara et 1 ex. de Diré. — Nom Habbé : *Sabondo.*

Considéré comme venimeux. — Espèce peu venimeuse, pour l'homme.

Psammophis sibilans L. — 1 ex. de Bandiagara. Noms vernaculaires : en Habbé : *Sabondo;* en Peulh; *Danesnona;* en Bambara : *Sadié.*

Echis carinatus Schn. — 1 ex. de Bandiagara.

En Habbé : *Kokodiou;* en Peulh : *Fossokéré;* en Bambara : *Fofoni.*

Atractaspis Watsonii Boulgr. — 1 ex. de Bandiagara.

En Habbé : *Nourodiou;* en Peuhl : *Balaiwona.* Mentionné comme *Naja* cracheur.

BATRACIENS

Bufo regularis Reuss. — 1 ex. Goundam; capturé sur la dune. Nom Sonraye : *Cormato.*